

Prevalencia del cáncer de ovario y retos ante su diagnóstico

PREVALENCIA DEL CÁNCER DE OVARIO Y RETOS ANTE SU DIAGNÓSTICO

Actualmente en **España** se diagnostican más de **3.000 nuevos casos** de cáncer de ovario al año, lo que provoca más de **1.900 fallecimientos anuales** por esta causa en nuestro país^{vi}.



El cáncer de ovario es el **CÁNCER GINECOLÓGICO MÁS LETAL** en mujeres^{i,ii}

en 2016 se diagnosticaron **~22 000** casos nuevos en los Estados Unidosⁱⁱⁱ
en 2012 se diagnosticaron **~65 000** casos nuevos en Europaⁱⁱ

Los síntomas iniciales **son inespecíficos y resultan difíciles** de detectar^{iv,v}:

- > Flatulencia
- > Dolor pélvico/abdominal
- > Dificultad para comer
- > Problemas urinarios



el 60 % de las mujeres con cáncer de ovario reciben el diagnóstico en una fase avanzada^v, cuando el pronóstico es desfavorable.

i. Siegel, R., J. Ma, Z Zou, and A Jemal. 2014. "Cancer Statistics, 2014." CA: A Cancer Journal for Clinicians 64 (1): 9–29. doi:10.3322/caac.21208.

ii. WHO, IARC GLOBOCAN, Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008 at <http://globocan.iarc.fr/>. Last Accessed September 28, 2016.


iii. National Cancer Institute. 2016. "Cancer of the Ovary - SEER Stat Fact Sheets." <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/ovary.html>. Last Accessed June 23, 2016.

iv. American Cancer Society. 2014. "Signs and Symptoms of Ovarian Cancer." <http://www.cancer.org/groups/content/@editorial/documents/document/acspc-044552.pdf>. Last Accessed September 28, 2016.

v. American Cancer Society. 2015. Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society. <http://www.cancer.org/research/cancerfactsstatistics/cancerfactsfigures2015/>. Last Accessed June 23, 2016.

vi. 1 Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers CD, Parkin D. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Disponible en: <http://globocan.iarc.fr> Acceso el 20 de marzo de 2012.

A pesar de las elevadas tasas de recidiva, hay algunas opciones nuevas de tratamiento



- vii. Birrer, M., et al. "Medical Treatment for Relapsed Epithelial Ovarian, Fallopian Tubal, or Peritoneal Cancer: Platinum-Resistant Disease." UpToDate. <http://www.uptodate.com/contents/medical-treatment-for-relapsed-epithelial-ovarian-fallopian-tubal-or-peritoneal-cancer-platinum-resistant-disease>. Last Accessed June 23, 2016.
- viii. Mirabeau-Beale KL, et al. Comparison of the quality of life of early and advanced stage ovarian cancer survivors. *Gynecologic Oncology*. 2009;114(2):353-359.
- ix. Cesario SK, et al. Sword of Damocles cutting through the life stages of women with ovarian cancer. *Oncol Nurs Forum*. 2010 Sep; 37(5): 609-617.
- x. Hanker LC, et al. The impact of second to sixth line therapy on survival of relapsed ovarian cancer after primary taxane/platinum-based therapy. *Ann Oncol*. 2012;23(10):2605-2612.
- xi. Bell J, Brady MF, Young RC, et al. Randomized phase III trial of three versus six cycles of adjuvant carboplatin and paclitaxel in early stage epithelial ovarian carcinoma: A Gynecologic Oncology Group study. *Gynecologic Oncology*. 2006;102(3):432-439.